~~[illegible]~~

nº 125.

Bandages nouveaux par
feu Mr. Martin Me. en
chirurgie a paris

ARC 33 d.5 nº 11

Les differents moyens que la Chirurgie Employe pour — Contenir Les hernies qui arrivent a la Circonference du bas ventre, ont étés si souvent Retouchés et on s'y Est pris de tant de facons differentes pour Les Rendres suportables et seurs, quil parait difficile de pouvoir faire quelques Réformes avantageuses ou d'ajouter de nouvelles perfections a ces machines.

Si on Considere, Cependant, quanciennement Les bandages Etoient tres jmparfaits; que peu a peu chaque Chirurgien qui en a Connut L'jnsufisance et Les deffauts, y a ajoutté quelque Chose du sien et que dans Ces derniers temps, des maitres de L'art, Egallement jngenieux et Eclairés, Les ont portés a un point de perfection quils n'avoient pas auparavant, on Conviendra que profitant de Ce que Ces derniers nous ont Laissés ~~Comme ils~~ [inserted: Ceux qui] ont scu [inserted: mettre a profit] ~~faire usage~~ [inserted: et Contentement] des Lecons de leurs prédécesseurs, on peut, a l'aide d'un peu de Réflexion de méchanique et d'experience, ~~[illegible]~~ Encherir sur Ce quils ont fait, de mesme que nous voyons aujourdhuy Les autres parties de la Chirurgie ~~Etre~~ se perfectionner de plus en plus depuis l'heureux Etablissement de Cette Célébre accadémie.

Comme je me suis particuliérement apliqué au traittement des hernies et que La pratique m'a fournis des occasions de faire des Remarques jmportantes sur ~~[illegible]~~ quelques deffauts des bandages ordinaires et mesme d'en jnventer quelques vns de Nouveaux, jay Crus que je pourois Les presenter a l'académie avec d'autant plus de Confiance que je ne les donne qu'apres ~~[illegible]~~ des épreuves faites ~~[illegible]~~ sous les yeux de plusieurs de ses membres, et qu'apres ~~qui en ont vüe~~ ~~[illegible]~~ des ~~[illegible]~~ succes bien ~~reconnüs~~ ~~[illegible]~~.

De tous les bandages dont on s'est servit jusqu'icy C'est, sans ~~[illegible]~~ Contredit, Celuy de l'aine qui semble le plus aprocher de la

De la perfection qu'il peut Recevoir, néanmoins La pratique m'a fait Remarquer que quelque bien fait et aplique qu'il soit, il ne Retient pas Seulement Les Especes d'hernies que nous apellons Coulantes et Complettes, qui Sortent aisément au moindre mouvement, soit parce que L'ouverture du muscle oblique Externe Est tres grande; soit que L'Epiploon qui Complique d'ordinaire La descente en favorise L'issüe par son onctuosité; ou qu'enfin L'une et Lautre Cause y contribüe; il arrive dans ce cas que Le bandage ne faisant pas une Compression toujours Egalle par Rapport aux differents mouvements du Corps, ou à sa situation qui en écartent plus ou Moins La pelotte, Les parties glissent aisément par dessous et tombent dans Le Scrotum; on Sait aussy que Lorsque le malade Est Couché Sur le dos, Les visceres se portent vers La poitrine et sur Les Costés, Le ventre Est Etallé et aplatti et par Cette Raison La plotte du bandage se trouvant Eloignée du point où Elle doit faire sa compression, Laisse La liberté aux parties de sortir Lorsque le malade tousse ou Eternüe et mesme en faisant des Efforts.

Pour Remédier à cet inconvénient j'ay imaginé un bandage a deux platines, dont L'une est continüe au demy cercle d'acier et La seconde placée en dedans tient supérieurement à la première par une charnière qui en fait le point fixe, pendant que la partie inférieure Reste et mobile au moyen d'un Ressort placé entre Les deux, qui tend toujours à la Raprocher du Corps dans le temps que la premiere peut s'en Eloigner par Les differents mouvements, ou la situation du corps, ou bien lorsque le bandage se trouve trop lâche et que la descente peut sortir comme nous venons de le dire; ainsy cette seconde platine qui Est continuellement poussée vers L'anneau, fait une compression d'autant plus avantageuse qu'elle se fait de Bas en haut et qu'elle Est toujours La mesme dans quelle attitude que soit Le corps quand mesme le bandage ne seroit que mediocrement serré.

L'hernie de L'ombilic n'est pas celle qui donne le moins

de peine à le retenir, le plus ou moins de plenitude ou de vacuité
du ventre y aporte un obstacle et ~~le~~ fait que le bandage est
tantot trop et quelque fois pas assez serré. d'ailleurs le bandage
dont on se sert dans cette maladie est elevé dans son milieu.
Le ventre sur lequel ce bandage s'aplique representant aussy
une figure demy sphérique, cela fait deux corps Ronds
dont l'un, comme on scait, Roulle aisement sur l'autre, en sorte
que dans les differents mouvements que fait celuy qui le porte,
le bandage monte ou descent, la pelotte pour lors au dessus ou au
dessous de l'ombilic incommode le malade et la hernie sort
très aisement ne trouvant rien qui s'oppose a son issüe.

Voicy un bandage dont la pelotte qui Remplit l'enfoncement
de l'ombilic, Reste fixe dans cette cavité malgré le déplacement
que peut souffrir la plaque en ~~haussant et baissant~~ ~~par Raport aux differents~~
~~exercices de la personne qui le porte~~. comme ce bandage est par ses plaques
un peu ~~concave~~ enfoncé, il arrive que plus il monte ou descent, plus
la pression qu'il fait sur la pelotte est forte et par consequent
la hernie demeure plus seurement Retenüe.

Pour placer méthodiquement ce bandage il est necessaire
d'ouvrir la petite fenestre, la placer sur ~~la~~ l'hernie qui
se presentera ~~...~~ à travers, passer la ceinture ~~...~~ autour du corps et l'arrester
au moyen de la boucle, ensuite on reduit l'hernie. on tient
un ou deux doigts dans l'enfoncement qu'elle laisse pendant
que de l'autre main on conduit la pelotte en la faisant
glisser sur les doigts qui retiennent la descente, et à
mesure que l'on ferme la fenestre on retire les doigts. la
pelotte prend leur place; on arreste la petite fenestre au
au moyen du crochet et on voit que le bandage peut souffrir
du déplacement sans que pour cela la pelotte se dérange
de l'endroit elle a étée placée.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

La plus part des grands Praticiens de nos jours ont trouvé que le bandage dont on s'est servi jusqu'icy pour la fistule au périné est non seulement génant et très peu seur, mais qu'il n'a pas la simplicité requise à toute les machines qui s'appliquent sur le corps humain, la pression qui se fait au moyen d'une vis ~~vis~~, est trouvée trop dure, elle blesse le malade qui ne peut s'assoir que sur un bourlet, elle augmente la duretée de la fistule et souvent y cause l'inflammation qui a été quelque fois suivie de pourriture; ces défauts dangereux m'ont fait penser à un moyen plus simple et sans doutte plus seur, puisqu'au moyen d'un ressort, qui fait une pression douce et continuelle sur la fistule dans quelle attitude que soit le corps, l'urine est retenüe, le malade peut s'assoir sur toutes sortes de sièges si durs et si plats qu'ils soient sans être incommodé par la pelotte et il a la facilité de l'oster et de le remettre dans ses différents besoins, en flechissant la cuisse et le faisant glisser par dessus la fesse.

Quand de placer le bandage il est necessaire de ranger son ressort du costé droit, on le place par dessus le demy cercle ensuite on passe la ~~[illegible]~~ ceinture autour du corps, on l'arreste par devant au crochet, on prend le ressort de la main droite on le fait couller par dessus la hanche en flechissant la cuisse afin d'effacer la rondeur de la fesse et on va placer la pelotte sur la fistule entre l'anus et le scrotum. Lorsque le malade veut aller à la garde robe il ramene le ressort sur le costé du bandage toujour en flechissant la cuisse du mesme costé et le replace ensuite de la manière que nous venons de le démontrer.

S'il est necessaire d'augmenter la pression du ressort, ou de l'affermir, on peut se servir de ses deux cordons qu'on passe de costé et d'autre du scrotum et que l'on vient attacher au bandage de chaque costé de l'aine.

Ce bandage n'est pas seulement propre pour la fistule au Périné
je m'en suis aussy servit plusieurs fois pour retenir la chutte de
l'anus ; mais comme le ressort est placé posterieurement et qu'il
est logé dans la gouttière qui se trouve entre les fesses j'ay
eu soins dans ce cas, de faire faire ce ressort plus court de sorte
que la pelotte au lieu de porter sur le Périné s'aplique
exactement sur l'extremitée du Rectum.

Ce mesme bandage peut etre aussy tres utile pour
l'incontinance d'urine qui arrive aux enfans aux viellards
et a ceux dans lesquels cette incommoditée est la suite
d'une maladie de la vessie et de son sphincter.

Il arrive tres souvent que la chutte du vagin ne peut etre
retenüe par le pessaire ordinaire pour plusieurs raisons
1° parce que le relachement de cette partie peut etre si considerable
que manquant presqu'entierement de ressort il laisse
échaper le pessaire. 2° la femme ne pouvant le souffrir de
grandeur necessaire il devient insuffisant et tombe.
3° parce que ce corps presse souvent le rectum, empeche la
femme d'aller a la garde robe de sorte qu'elle est obligée
de l'oster chaque fois. 4° on voit frequamment qu'il occasionne
le gonflement et un prurit quelque fois suivi d'inflammation
d'ulceration et autres accidens qui obligent de l'oster
promptement et lorsque cette enflure est portée a un certain
degré on a beaucoup de peine a l'extraire le pessaire
comme je l'ay vu arriver a une dame qui souffroit des
douleurs enormes depuis quatre jours avec fievre et une
enflure si considerable de la partie affectée que je ne
pus la délivrer de ce corps etranger qu'apres luy avoir
fait trois saignées du bras en douze heures, des fomentations
emolientes et anodines &c. apres quoy je tiray le pessaire
non sans peine, et il sortit ensuite plus d'un verre de
pus tres fétide. 5° nous voyons enfin a certaines femmes

ACAD. NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

que ce ~~d...~~ Relachement ne peut être reduit à cause de la douleur que la malade ressent lorsque l'on ~~...~~ tente en tenter la rentrée.

Il a donc fallu dans ces differents cas trouver des moyens qui supleassent au deffaut du pessaire qui etoit, comme on vient de le voir, non seulement inutiles mais mesme dangereux; ce bandage que j'ay inventé pour cet effet a un cercle Elastique qui ne gêne point celle qui le porte, la pelotte longuette et recourbée s'aplique exactement sur l'exterieur de la partie, y fait une compression douce et sufisante pour retenir le vagin et l'obliger de rester dans son lieu naturel; la malade a la facilité de l'ôter et de la remettre suivant le besoin et elle se porte à droit et à gauche suivant les differents mouvements des cuisses, sans que pour cela il cesse de presser et de s'oposer à la sortie de la hernie vaginale, enfin la malade peut s'assoir sur les siege les plus durs sans être incommodée de cette pelotte.

J'ay vû dans deux occasions que ce bandage a produit des effets au delà de ce que j'osois esperer car ayant fait faire des fomentations legérement astringentes sur des parties relachées elles ont prit peu à peu du ressort de sorte qu'après six ou sept mois de l'usage du bandage, aidé de ces fomentations, les malades ont ~~...~~ abandonnés l'un et l'autre et se sont trouvées entiérement gueries.